


Hepatitis A, B, C

Imunochromatické kazetkové testy pro použití odborným zdravotnickým personálem.
Určeno pouze pro *In Vitro* diagnostické použití.



HAV IgG/IgM Hepatitis A kat. č. 622070

Testovací kazeta **protilátek** hepatitidy A. Vzorek: plná krev, sérum, plazma. **Balení - 30 testů.**
Cena za test 154,- Kč bez 21 % DPH. (186,- Kč vč. DPH).

HAV IgG/IgM Rapid Test je laterální průtoková chromatografická imunoanalýza pro kvalitativní detekci a diferenciaci protilátek (IgG a IgM) proti viru hepatitidy A (HAV).

INFO®Anti-HBs Hepatitis B kat. č. 622091

Testovací kazeta **protilátek** hepatitidy B. Vzorek: plná krev, sérum, plazma. **Balení - 40 testů.**
Cena za test 109,- Kč bez 21 % DPH. (132,- Kč vč. DPH).

Pozitivní nález protilátek anti-HBs je důsledkem prožitého onemocnění nebo úspěšné aktivní imunizace. Tyto protilátky lze detekovat i po aplikaci hyperimunního globulinu proti virové hepatitidě B (HBIG), obvykle vymizí po 3 měsících od aplikace. Anti-HBs protilátky v dostatečných titrech (po prožitém onemocnění nebo po aktivní imunizaci) poskytují ochranu proti infekci HBV.

INFO®HBsAg Hepatitis B kat. č. 622093

Testovací kazeta **antigenu** hepatitidy B. Vzorek: plná krev, sérum, plazma. **Balení - 40 kusů.**
Cena za test 108,- Kč bez 21 % DPH. (131,- Kč vč. DPH)

HBsAg lze v séru detekovat několik dní až týdnů před a několik týdnů až měsíců po začátku onemocnění. Jeho přetrvávání déle než 6 měsíců je klasifikováno jako stav chronického nosičství HBsAg, které může být asymptomatické, nebo provázené známkami jaterního poškození (chronická hepatitida aktivní nebo perzistující, nověji chronická hepatitida B). HBsAg je povrchový antigen HBV viru. Tento proteinový antigen tvoří obal HBV viru a jeho přítomnost v krvi značí právě probíhající hepatitidu typu B a aktivní replikaci viru.

INFO®Anti-HCV Hepatitis C kat. č. 622094

Testovací kazeta **protilátek** hepatitidy C. Vzorek: plná krev, sérum, plazma. **Balení - 40 kusů.**
Cena za test 103,- Kč bez 21 % DPH. (125,- Kč vč. DPH)

Protilátky jsou markerem expozice – kontaktu dané osoby s virem hepatitidy C. Protilátky anti-HCV nemají neutralizační efekt, nejsou nositelem imunity organismu. Přetrvávají ve značném titru i u pacientů úspěšně vyléčených. Vyšetření anti-HCV protilátek je možno chápat jako screeningové vyšetření u všech osob, u kterých je podezření, že byly někdy v průběhu života viru exponovány.



Objednávky ČR:
JK-Trading s.r.o.
Křivatcová 421/5,
155 21 Praha 5-Zličín
tel.: 257 220 760
email: praha@jktrading.cz

Objednávky SK:
JK-Trading s.r.o.
Dlhá 1264/43,
900 31 Stupava
tel.: 0907 670 888, 0264 776 790
email: jk-trading@jk-trading.sk

Více informací:
Ing. Kryl 777 929 604
Ing. Žůrová: 777 929 623
www.jktrading.cz
www.jk-trading.sk